

Bijwerkingen Omegaven®

In het geval van het optreden van bijwerkingen, dienen deze zo snel mogelijk (< 24 uur) gemeld te worden bij de arts-onderzoeker!

Bijwerkingen die tijdens de toediening van Omegaven® zijn waargenomen:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)	<ul style="list-style-type: none">• Verlengde bloedingstijd en verminderde bloedstolling• Een vissmaak in de mond
--	--

Bijwerkingen die tijdens de toediening van vetemulsies zijn waargenomen:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 gebruikers)	<ul style="list-style-type: none">• Buikpijn, misselijkheid, braken• Verhoogde lichaamstemperatuur, rillingen, koude rillingen, vermoeidheid• Hypertriglyceridemie• Hoofdpijn
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)	<ul style="list-style-type: none">• Anafylactische reactie• Huiduitslag, urticaria• Bloedcirculatiestoornissen bijv. hypertensie of hypotensie• Afwijkende bloedwaarden (trombocytopenie, hemolyse, reticulocytose)• Voorbijgaande stijging van de leverfunctiewaarden• Priapisme

Men dient hierbij op mogelijke tekenen van metabole overbelasting te letten. De oorzaak hiervan kan genetisch zijn (individueel verschillende metabolismen) of kan te wijten zijn aan doorgemaakte ziekten. Dit werd echter voornamelijk waargenomen bij het gebruik van emulsies van katoenzaadolie.

Metabole overbelasting kan de volgende symptomen veroorzaken:

- vergroting van de lever (hepatomegalie) met of zonder icterus
- een verandering of vermindering van een aantal stollingsfactoren (bijv. bloedingstijd, stollingstijd, protrombinetijd, aantal bloedplaatjes)
- vergroting van de milt (splenomegalie)
- onregelmatigheden in het bloed: bloedarmoede, laag aantal witte bloedcellen
- bloedingen en bloedingsneiging
- afwijkende leverfunctiewaarden
- koorts
- hyperlipidemie
- hoofdpijn, maagpijn, vermoeidheid
- hyperglycemie

Als een van deze bijwerkingen optreedt, kan het zijn dat de infusie dient te worden stopgezet of, indien nodig, aan een lagere dosis wordt voortgezet.

Overdosering kan tot het **syndroom van vetoverbelasting** leiden:

Dit kan optreden wanneer het lichaam problemen heeft om vetten te verbruiken, omdat het te veel Omegaven[®] heeft gekregen. Dit kan ook optreden omwille van een plotse verandering in de toestand van de patiënt (zoals nierproblemen of een infectie). Mogelijke tekenen zijn koorts, problemen met verschillende organen van het lichaam of zelfs coma. Al deze symptomen zullen doorgaans verdwijnen wanneer de infusie wordt stopgezet.

Een ernstige overdosering met Omegaven[®] zonder gelijktijdige toediening van een koolhydratenoplossing kan tot metabole acidose leiden.