



Datum:

Studienummer:


## Dataformulier Translationeel Cohort

 **Start tacrolimus infusie**






\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

 **Tijdstip toediening diclofenac**

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_



### Baseline afname

-  10 mL EDTA buis – kantelen 5–10 keer
-  6 mL serumbuis – kantelen 5 keer
-  2,5 mL PAXgene buis – kantelen 5–10 keer
-  Rectale swab
-  Speekselafname

### TIJD NOTEREN





#### Baseline afname

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

### Start ERCP



### ~ 2 uur na start ERCP




-  10 mL EDTA buis – kantelen 5–10 keer
-  6 mL serumbuis – kantelen 5 keer
-  2,5 mL PAXgene buis – kantelen 5–10 keer
-  Rectale swab
-  Speekselafname

#### ~ 2 uur na start ERCP

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_





#### BLOEDAFNAME

-  10 mL EDTA buis – kantelen 5–10 keer
-  6 mL serumbuis – kantelen 5 keer
-  2,5 mL PAXgene buis – kantelen 5–10 keer



#### OVERIGE AFNAMES

-  Rectale swab
-  Speekselafname



#### VERWERKING

- EDTA-buis: 5–10 keer voorzichtig kantelen
- PAXgene-buis: 5–10 keer voorzichtig kantelen
- Serumbuis: 5 keer voorzichtig kantelen

#### Contactgegevens:

Malin Witteman

Tel: 088-3207054

Mail: m.witteman1@amsterdamumc.nl