

Metamizol als poliklinische pijnbehandeling bij patiënten met chronische pancreatitis



RATIONALE

Doel: optimaliseren pijnbeleid bij chronische pancreatitis

Metamizol


- Sterk analgeticum, spasmolytisch
- Oraal gebruik

STUDIE POPULATIE

- Chronische pancreatitis
- Pijn in de thuissituatie
- Onafhankelijk van huidige pijnbehandeling of eerdere interventies (m.u.v. hoge dosering opioïden)

“MISSION-populatie”:
Voornamelijk patiënten met matige en relatief stabiele pijn

DESIGN



- RCT naar de effectiviteit van het toevoegen van oraal metamizol aan de huidige pijnbehandeling

Open voor inclusie!

ook voor niet-deelnemende centra

Behandelopties door heel Nederland



Tips and tricks voor includeren



1. **Altijd even de pijnscore checken op de poli!**

Pijnscores zijn vaak hoger dan je verwacht. Door actief naar pijn te vragen kunnen meer patiënten geïnccludeerd worden (*inclusie criterium: NRS ≥ 3 , ≥ 3 dagen/week*)



2. **Opgenomen met acute-op-chronische pancreatitis? Denk: MISSION!**

Wordt iemand opgenomen met acute-op-chronische pancreatitis? Vraag dan meteen naar pijnklachten in de thuissituatie. Zo ja, dan zou patiënt mogelijk deel kunnen nemen aan MISSION



3. **Nog even geduld met andere pijntrajecten...**

Bij potentiële MISSION-patiënten zien we vaak dat er meteen meerdere trajecten worden gestart (denk aan: anesthesie, ERCP ect.). Maar let op: MISSION en andere pijninterventies kunnen niet tegelijk lopen - dat zou de resultaten verstoren. De studie duurt maar 6 tot 8 weken. Daarna is er alle ruimte voor andere pijnbehandelingen. Dus: eerst MISSION, dan de rest 😊