

Genetica bij Post-ERCP Pancreatitis

ERCP? Denk aan G-PEP en prik een buis bloed mee!

Exclusiecriteria

- Acute pancreatitis op moment van ERCP
- Veranderde anatomie (bijv na chirurgie)
- Contra-indicatie NSAID
- Chronische pancreatitis
- Routine galwegstentwissel

Bloedafname 1: Vóór de diclofenac



Laatste cijfer is een 1,
voorbeeld G-PEPW001-1



Tijdstip bloedafname noteren
op labformulier +
dataformulier



Stuur het hele setje 1 naar
het lab + labformulier

Dataformulier

G-PEP

Studienummer:
Datum:

Bloedafname voor ERCP (10ml EDTA-buis)
Tijdstip afname :

Stuur afnameset 1 naar het lab en geef dit formulier met
patiënt mee naar scopie

Tijdstip toediening diclofenac :

Bloedafname 2 uur na toediening diclofenac (10ml EDTA-buis)
Tijdstip afname :

Stuur afnameset 2 naar het lab en leg dit formulier op de stapel

Vragen? m.witteman1@amsterdamumc.nl / 088-3207054

Bedankt!

Dataformulier
meegeven met
patiënt naar scopie
+
**ERCP: Tijdstip toediening
diclofenac noteren en
canulatiepogingen CBD
bijhouden**

Bloedafname 2: 2 uur na de diclofenac



Laatste cijfer is een 2,
voorbeeld G-PEPW001-2



Tijdstip bloedafname noteren
op labformulier +
dataformulier



Stuur het hele setje 2 naar
het lab + labformulier

Contact

Malin Witteman

T: 088-3207054

M: m.witteman1@amsterdamumc.nl

www.pancreatitis.nl