

ERCP? Denk aan G-PEP en prik een buis bloed mee!

Pak afnamesetje 1 (laatste cijfer is een 1, voorbeeld G-PEPX001-1).
Vul de datum in op dataformulier en labformulier.



Neem dummybuis af en nadien 10ml EDTA buis (alles zit in afnameset)



Tijdstip bloedafname noteren op labformulier en op dataformulier.
Dataformulier met patiënt mee naar scopie.



Afnameset 1 (volle EDTA buis, 4 kleine plasticbuisjes) naar lab sturen



ERCP: Tijdstip toediening diclofenac noteren op dataformulier en
canulatiepogingen CBD bijhouden.



Twee uur na toediening diclofenac: pak afnameset 2 (let op, zelfde
studienummer als dataformulier, met nu laatste cijfer 2).



Tijdstip bloedafname noteren op labformulier en op dataformulier en
dataformulier op stapel op endoscopiecentrum leggen



Afnameset 2 (volle EDTA buis, 4 kleine plasticbuisjes en labformulier)
naar lab sturen.

Exclusiecriteria

- Acute pancreatitis op moment van ERCP
- Veranderde anatomie (bijv na chirurgie)
- Contra-indicatie NSAID
- Chronische pancreatitis
- Pancreascarcinoom
- Routine galwegstentwissel

Contact

Malin Witteman
T: 088-3207054
M: m.witteman1@amsterdamumc.nl
www.pancreatitis.nl