

Genetica bij Post-ERCP Pancreatitis

ERCP? Denk aan G-PEP en prik een buis bloed mee!

Exclusiecriteria

- Acute pancreatitis op moment van ERCP
- Veranderde anatomie (bijv na chirurgie)
- Contra-indicatie NSAID
- Chronische pancreatitis
- Routine galwegstentwissel

Contact

Malin Witteman
088-3207054
m.witteman1@amsterdamumc.nl
www.pancreatitis.nl

Bloedafname 1: Vóór de diclofenac

*Laatste cijfer is een 1,
voorbeeld G-PEPH001-1*



*Neem indien
nodig eerst
dummybuis af
en nadien 10ml
EDTA buis*

*Tijdstip bloedafname noteren
op labformulier +
dataformulier*

*Stuur het hele setje 1 naar
het lab*

Dataformulier

G-PEP Studienummer:
Datum:

Bloedafname voor ERCP (10ml EDTA-buis)
Tijdstip afname :

Stuur afnameset 1 naar het lab en geef dit formulier met
patiënt mee naar scopie

Tijdstip toediening diclofenac :

Bloedafname 2 uur na toediening diclofenac (10ml EDTA-buis)
Tijdstip afname :

Stuur afnameset 2 naar het lab en leg dit formulier op de stapel


Vragen? m.witteman1@amsterdamumc.nl / 088-3207054

Bedankt!

*Dataformulier
meegeven met
patiënt naar scopie
+
ERCP: Tijdstip toediening
diclofenac noteren en
canulatiepogingen CBD
bijhouden*

Bloedafname 2: 2 uur na de diclofenac

*Laatste cijfer is een 2,
voorbeeld G-PEPH002-2*



*Neem indien
nodig eerst
dummybuis af
en nadien 10ml
EDTA buis*

*Tijdstip bloedafname noteren
op labformulier +
dataformulier*

*Stuur het hele setje 2 naar
het lab*