



Metamizol als pijnbestrijding bij chronische pancreatitis (poliklinisch)

Chronische Pancreatitis en Pijn?

CONTACTEER PWN

Contactgegevens: Naomi Thierens

☎ 088 320 7050 ✉ mission.studie@antoniuziekenhuis.nl

INCLUSIE CRITERIA

- Diagnose chronische pancreatitis
- Pijnklachten passend bij chronische pancreatitis

EXCLUSIE CRITERIA

- Meer dan 90 milligram morfine equivalent per dag
- Endoscopische of chirurgische pancreasinterventie voor pijn < 3 maanden voor inclusie
- Start pregabaline, amitriptypine of gabapentine < 6 weken voor inclusie
- Geplande interventie CP binnen studie periode (6 weken)
- Pancreascarcinoom
- Ascal gebruik of allergie voor NSAID's




Scan QR code
voor contact
via Siilo



Kijk voor meer informatie op www.pancreatitis.nl

MISSION trial

- RCT naar de effectiviteit van oraal metamizol bij chronische pancreatitis
- Placebo gecontroleerd, dubbelblind
- Behandelduur 4 weken



Keypoints

- Onderzoek naar de effectiviteit van de pijnstiller metamizol
- Huidige opties voor pijnstilling bij chronische pancreatitis veelal opiaten, welke veel nadelen kennen (maag/darm klachten, sufheid, tolerantie, toename pijn sensatie)
- Metamizol is een geregistreerd pijnmedicijn
- Gerandomiseerde studie: de helft gebruikt de huidige pijnmedicatie plus metamizol 3dd2 tabletten, de andere helft gebruikt de huidige pijnmedicatie plus placebo 3dd2 tabletten
- Dubbelblind: zowel de patiënt als de arts weet niet welk medicijn u krijgt

CONTACTEER PWN bij mogelijke inclusie

- Verdere informed consent en instructie via studietoecoördinator
- Noteer akkoord van patiënt voor benadering studietoecoördinator in EPD